

LIKRA-San[®] – javítja az emésztést

Hízósertés takarmányozásban

Georg Austermann Geisterfeld 1, 59329 Wadersloh Németország intenzív sertéshizlalást folytat. A hízókat 3 fázisban takarmányozza. A felhasznált takarmányok gabona-szója és premix.



2016 elején ismerte meg a **LIKRA San-t**, és úgy döntött, hogy lefolytat egy etetési kísérletet három turnuson keresztül, szűk egy év alatt. A kísérlet folyamán a hízó táp a gabonán és a szóján kívül csak az **Amino-Mast LIKRA-San** neu-t tartalmazta. A takarmány adag optimalizálását Lutz Hellmich a Martin Wessling, Lippetal cég szaktanácsadója végezte.

Az etetési kísérlet eredménye

1. A korábbi magas színvonalú eredményeket a súlygyarapodás, állategészségügy és húsminőség területén továbbra is problémamentesen elérték

2. 2. A fajlagos takarmány felhasználás szignifikánsan javult:

Fajlagos takarmány felhasználás 2016 előtt:	Fajlagos takarmány felhasználás 2016-ban a kísérlet ideje alatt
1 : 2,95 kg	Amino-Mast LIKRA-San-nal : 1 : 2,65 kg

→ Fajlagos takarmány felhasználás **0,3 kg**-mal javult

→ Kevesebb takarmány felhasználás-alacsonyabb takarmányozási költség:
> 27 kg –mal kevesebb hízótáp/sertés x 0,24 € / kg = 6,48 € /sertés

→ A **Likra San** alkalmazása a receptúrában 2,43 EUR/sertés többlet költséget jelentett

→ Nyereség a **LIKRA-San 4,05 €** /sertés éves átlagban

3. Pozitív hatása a sertés trágya kibocsátásra

→ **50 kg** –mal csökkent a trágyakibocsátás sertésenként

>> az ebből eredő megtakarítás kb. 0,60 €/sertés

→ **15 %** -kal kevesebb foszforkibocsátás a trágyával

4. A jobb fehérjehasznosulás miatt, érezhetően javult az istálló levegő minősége

Az Amino – Mast **Likra San** etetésével az Austermann Farm **4,05 €** többlet bevételhez jutott sertésenként

LIKRA-San[®]
 – javítja az emésztést